


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М.К.
» 201 г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

БАКТОКС 125 мг/5 мл . 250 мг/5 мл
500 мг/5 мл



LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL

порошок для пероральной взвеси в ампуле

Прочтите внимательно всю аннотацию перед началом приема данного препарата.
• Храните данную аннотацию. Вам может понадобиться прочитать ее еще раз.
• Если у вас есть любые дополнительные вопросы, спросите врача или фармацевта.
• Данный препарат должен быть назначен только вам. Не передавайте его другим лицам. Он может нанести им вред, даже если их признаки болезни совпадают с вашими.
• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. К таким побочным эффектам относятся любые возможные побочные эффекты, не перечисленные в данной аннотации. Смотрите раздел 4.

Что содержится в данной аннотации:

1. Что такое порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле и для чего он применяется
2. Чем важно знать перед началом приема порошка для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле
3. Как принимать порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле
6. Содержание упаковки и другая информация

1. ЧТО ТАКОЕ ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ ВЗВЕСИ БАКТОКС В АМПУЛЕ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Фармацевтическая группа: Пенициллины широкого спектра – ATX-код (Код по Анатомической, Терапевтической, Химической системе классификации): J01CA04

Что такое БАКТОКС?

БАКТОКС – антибиотик. Действующее вещество – амоксициллин. Относится к группе препаратов, называемых «пенициллинами».

Для чего применяется БАКТОКС?

БАКТОКС применяется для лечения заражений, вызванных бактериями в различных частях тела. БАКТОКС также можно применять в сочетании с другими препаратами для лечения язвы желудка.

2. ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЕМА порошка для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле

Не принимайте порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле:

- Если у вас есть аллергия на амоксициллин, пенициллин либо какие-либо другие ингредиенты данного препарата (перечислены в разделе 6).
- Если вы имеете либо когда-либо имели аллергическую реакцию на антибиотики. Это может включать кожную сыпь или отек лица или горла.

В случае болезни Феллинга (наследственное заболевание, обнаруживаемое при рождении) из-за наличия аспартата.

Не принимайте БАКТОКС если у вас существует какая-либо из вышеуказанных ситуаций.

В случае каких-либо сомнений, обратитесь за советом к вашему врачу или фармацевту перед тем, как принимать БАКТОКС.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите с вашим доктором или фармацевтом перед тем, как принимать порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле, если вы:

- Страдаете инфекционным мононуклеозом (жар, боль в горле, воспаленные лимфоузлы и краинка усталистой) • имеете проблемы с почками • мочитесь негруяльно.

В случае каких-либо сомнений, обратитесь за советом к вашему врачу или фармацевту перед тем, как принимать БАКТОКС.

Анализы мочи и крови

Если вам требуется:

- анализ мочи (глюкозы крови) или крови для исследования функции вашей печени,
- анализ на эритроцит (применяется во время беременности, чтобы проверить, что ребенок развивается нормально).

Расскажите вашему врачу или фармацевту, что вы принимаете БАКТОКС. Фактически, БАКТОКС может повлиять на результаты этих анализов.

Другие препараты и порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле

Расскажите вашему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или могли принять какие-либо другие лекарства.

- Если вы принимаете аллопуринол (используемый при лечении подагры), в сочетании с БАКТОКС, возникает более высокий риск аллергической кожной сыпи.

• Если вы принимаете пробенецид (используется при лечении подагры), ваш врач может решить изменить вашу дозу БАКТОКС.

• Если вы принимаете лекарства для разжижения крови (например, варфарин), вам могут потребоваться дополнительные анализы крови.

• Если вы принимаете другие антибиотики (например, тетрациклины), БАКТОКС может быть менее эффективным.

• Если вы принимаете метотрексат (используется для лечения рака и тяжелого псориаза), БАКТОКС может привести к увеличению побочных эффектов.

Беременность и кормление грудью

Если вы беремены или кормите грудью, думаете, что вы беременны или планируете иметь ребенка, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать данный препарат.

Вождение и пользование автомобилем

БАКТОКС может вызывать побочные эффекты (такие как аллергические реакции, головокружение и судороги), которые могут ухудшить вашу способность водить машину. Не садитесь за руль и не пользуйтесь автомобилем, если плохо себя чувствуете.

Порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле содержит аспартам, натрий, мальтодекстрин и бензоат натрия

Аспартам (E951) – источник фенилаланина. Он может быть вредным для пациентов с болезнью Феллинга.

Данный препарат содержит 6,26 мг натрия на мерную ложку. Это следует принимать во внимание пациентам, у которых есть строгая диета с низким содержанием соли.

Мальтодекстрин поглощается в виде глюкозы. Если ваш врач сказал вам, что у вас есть непереносимость некоторых сахаров, свяжитесь с ним или с ней, прежде чем использовать данный препарат.

Из-за присутствия бензоата натрия (E211) это лекарство может вызвать раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек и увеличить риск жалоб (покраснение кожи и глаз) у новорожденных.

3. КАК ПРИНИМАТЬ порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле:

Всегда принимайте данный препарат точно в соответствии с указаниями вашего врача или фармацевта. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы сомневаетесь.

• Тщательно встраивайте ампулу перед каждым приемом.

• Пользуйтесь мерной ложкой, поставляемой с ампулой.

• Регулярно принимайте препарат, назначаемые дозы препарата в течение дня; дозы следует принимать с интервалом не менее 4 часов.

Стандартная дозировка:

Дети, массой до 40 кг:

Все дозы определяются в соответствии с массой ребенка в килограммах.

• Ваш врач скажет вам, какую дозу БАКТОКС вы должны дать вашему младенцу или ребенку.

• Стандартная доза составляет от 40 мг до 90 мг на килограмм массы тела в день, она назначается в два или три приема.

• Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг на килограмм массы тела в день.

Взрослые, пожилые пациенты и дети массой 40 кг и более:

Данная взвесь обычно не назначается взрослым и детям, массой более 40 кг. Проконсультируйтесь у вашего врача или фармацевта.

Проблемы с почками

Если у вас есть проблемы с почками, доза может быть уменьшена по сравнению со стандартной дозой.

Методы и пути доставки

Пероральный метод приема.

КАК ДОЛГО ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНИМАТЬ порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле?

• Вы должны продолжать принимать БАКТОКС столько, сколько назначил ваш врач, даже если вам будет лучше. Каждая доза важна для борьбы с заражением. Если некоторые бактерии выживают, они могут стать причиной рецидива заражения.

• Как только вы закончите лечение, проконсультируйтесь с вашим врачом, если ваши симптомы сохраняются.

Микозы (грибковые заражения), возникающие в влажных областях тела, которые могут вызывать боль, зуд и белые выделения могут развиваться, если БАКТОКС используется в течение длительного периода. Если это так, сообщите своему врачу.

Если вы принимаете ВАСТОХ в течение длительного периода времени, ваш врач может провести дополнительные анализы, чтобы проверить, нормально ли функционируют ваши почки, печень и кровь.

Если вы принимаете порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле больше, чем должны

Если вы принимали БАКТОКС больше назначенной нормы, это может привести к боли в животе (тошнота, рвота или диарея) или образование кристаллов в моче, что вызывает расстройства или боль при мочеиспускании.

Если это произойдет, проконсультируйтесь с врачом как можно скорее. Принесите препарат, чтобы показать ему свою проблему.


Если вы забыли принять порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле

• Если вы забыли принять препарат, примите его, как только вспомните.

• Не принимайте следующую дозу слишком рано; подождите около 4 часов, прежде чем принимать следующую дозу.

ИЛОВА-ВАРАКАСИ: ИСТЕМЬМОЛЧИ УЧУН МАЪЛУМОТ

БАКТОКС 125 мг/5 мл . 250 мг/5 мл
500 мг/5 мл



LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL

ампулада перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун

Препаратни қабул қилиши бошланган олдин иловани диккат билан ўқиб чининг.

• Антитуберкулези сақлаб кўйинг. Уни Сизга яна бир марта ўқиб чиниш зарурати бўлиши мумкин.

• Агар сизда бирон-бир кўшичма саволлар бўлса шифорок ёки фармацевтдан сўнгани.

• Ушибу препатрат факат сизга буорилган бўлиши мумкин. Уни бошқаларга бериди юборман. Агар хотто улар касаллик белгилари сизнинг билан ўшаш бўлса хам у уларга зарар етаклиси мумкин.

• Агар сизда бирон-бир ножӯй самаралар пайдо бўлса, ўзингилигин шифорок ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг. Бундай ножӯй самараларга аннотацияда санаф утилмаган хар қандай ножӯй самаралар таалкулайдир. 4 бўлумга қаран.

Ушибу аннотация нима сақлайди:

1. Ампулада БАКТОКС перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун ўзи нима ва у нима учун кўлланади

2. Ампулада БАКТОКС перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун қабул қилишдан олдин сиз нималарни билишингиз керак

3. Ампулада БАКТОКС перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун қандай қабул қилиш керак

4. Күтиладиган ножӯй самаралар

5. Ампулада БАКТОКС перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун қандай сақлаш керак

6. Урам ичидагиси ва бошқа маълумот

1. Ампулада БАКТОКС перорал қўллаш учун суспензия тайёрлаш учун кукун ўзи нима ва у нима учун кўлланади

Фармацевтические групки: Көнг таъсир доирасига эга пенициллинлар – ATX-коди (Код по Анатомик, Терапевтический, Химик тизим тасиғи бўйича Код): J01CA04

БАКТОКС нима учун кўлланади?

БАКТОКС – антибиотикдир. Таъсир этиви моддаси – амоксициллин. «Пенициллинлар» деб атталучи гурӯҳ преглатрига таалуқли.

БАКТОКС нима учун кўлланади?

БАКТОКС танинг турли соҳаларидаги бактериялар чақирган инфекцияларни

даволашиб олди. БАКТОКС нима учун кўлланади.

БАКТОКС шунингдек мъеда ярасини даволаш учун бошқа препатратлар билан бирга кўлланаш.

Если это произойдет, проконсультируйтесь с врачом как можно скорее. Принесите препарат, чтобы показать ему свою проблему.

Если вы забыли принять порошок для пероральной взвеси БАКТОКС в ампуле

• Если вы забыли принять препарат, примите его, как только вспомните.

• Не принимайте следующую дозу слишком рано; подождите около 4 часов, прежде чем принимать следующую дозу.

ИЛОВА-ВАРАКАСИ: ИСТЕМЬМОЛЧИ УЧУН МАЪЛУМОТ

БАКТОКС 125 мг/5 мл . 250 мг/5

ва оёқ кафтларида, теридағы юкори концентрик шикастланышлар, оғиздеги, күш ва жинсий азольдар шилділік қаватидаги сезуевчанлик. Ушбу реакция иситма ва күчли тоқишиш чакириши мүмкін.

• Барда күчли тери реакциялары, шу жумладан: тери рангниң үзгәриши, тери остида күмок, қаварчик, күш бузар, терини кепикланыш, кизарыш, оғрик, құчишиш, шұралашы. Ушбу симптомлар иситма, бөш оғриги ва мушак оғриги билан күзатилади.

• Гигтап үшеше симптомлар терида тошма билан күзатилади. иситма, яллигланган лимфа түгунлар аномал қон таҳлили натижалары [шу жумладан оқ қон танағаларини ошиши (эозинофилия) ва жигар ферменттері] эозинофилия билан препаратаға реакциясы таизиме симптомлар (дорили тошма эозинофилия ва тизимли күршишлар билан).

• Иситма, этни увишиши, томокда оғрик ёки бошқа юқиши белгилари, күргина күйкүршишлар. Ушбу ножұй самаралар қон билан мұммалор белгиси бүлиши мүмкін.

• Әріша-Герксеймер синдромы Лайма касалыгини даволаш вактида БАКТОКС әрдамда пайдо бүлиши мүмкін, иситма, этни увишиши, бөш оғриги, мушакларда оғрик ва терида тошмалар олиб келшиши мүмкін.

• Диарея (базыда қон кетиши билан күзатилади), оғрик ва иситма белан күзатиладын жүйен ишаки яллигланши.

• Жигар учун жиддий мұммалор пайдо бүлиши мүмкін. Улар асосан узоқ даволанған әрәклар ва кекса пациентларда күзатилади. Кейнинг холатларда сиз зудлық билан шифокорга мурожаат қышишніз керек.

• Қон арапаш күчли диарея;

- қаварчик, кизарыш ёки терида қон тағшарларни нағомей бүлиши;

- сыйник түкшашын ёки рангизланған ахлат;

- терини екі күләнни сариқашашын жеткүзүш. Күйінде келтирилген сариқұнка олиб келауын анемия хакида маълумотта қаранды.

Ушбу реакциялар дорин күлән күләншында күзатилади. Кейнинг холатларда сиз зудлық билан шифокорга мурожаат қышишніз керек.

Агар сизда юкорида күрсатылған реакциялардан бирі пайдо бўлса, препарата күллашни бекор қилинг ва зудлик билан шифокорга мурожаат қилинг.

Тери реакциялары базыда камроқ ифодаланған бўлиши мүмкін:

• Уртча киришиши билан кечувчи терида тошма (думалоқ пүшти ранги ёки кызыл доглар), билакларни, оёқларни, күл кафтлары ва сёқ товони мушак рельефларини концентрик шикастланышлар. Ушбу холатлар кам пайдо бўлади, (100 одамдан 1 тасида учрайди).

Агар ушбу симптомлардан бирон-бiri пайдо бўлса, шифокорга мурожаат қилинг, чунки сиз БАКТОКС ни қабул қылмаслигингиз керак.

Бошқа күтилагандан ножұй самаралар:

• Тез-тез (10 одамдан 1 тасида күзатилади) • Тери тошмаси • Күнгил айниши

Диарея

Тез-тез эмас (100 одамдан 1 тасида күзатилади)

Кусиши жуда кам холларда (10 000 одамдан 1 тасида күзатилади)

• Микоз (замбургли шикастланышлар, улар кинда, оғиз бүшлигиде ёки тери бурмалари ривожланади); сиз шифокор ёки фармацевттадан замбургларни даволаш хакида сұрашын мүмкін. • Бүйрак мұммалор - Бүйрак хуржулар, айникса юкори дозалар кабул күлгүчеси мүмкін. Бүйрак мұммалор бүлгән пациентлардаги хуржулар • Баш айланышы • Гиперактивлик • Сидикдаги кристаллар бүзилишлар, дискомфорт ёки сийшии күйинләнешін чакиради. Бы хавфларни камайтиши учун күл суюқтап ишиш керак. • Тишларда доглар пайдо бүлиши мүмкін, улар отадат тиш шеткаши билан зогланғанда кетди (болаларда күзатылған). • Тишилар, жигар ран, кора ранг бүлиши ва түб билан колланғандеги туолади. • Кизил қон танағаларини хаддан күп шишии анемия турини чакиради. Симптомларға баш оғриги, хансириш, баш айланышы, оқарини, терини сариқашашында күләнни оқарини. • Өк қон танағаларини сочини кайиши • Қон ишуванлыгыда иштирек итүвчи кам соңли хужайралар • Қон ишуванлыгы сеңкінлешін мүмкін. Сиз буни бурундан қон кетишилар ёки шинилишларда күзатылған мүмкін.

Ножұй самаралар хакида хабар беріш

Агар сизда бирон-бiri ножұй самаралар пайдо бўлса үзингизнин шифокор ёки фармацевт билан гаплашын. Улар иловада күрсатылған ҳар қандай күтилагандан ножұй самараларни ўз ичига олади. Шүнгіндег сиз мамлакатнанын фармакологик низорат Комитеттің тақсилот орталығы түркістан түркістандағы күтилагандан кетди (богаларда күзатылған). • Тишилар, жигар ран, кора ранг бүлиши ва түб билан колланғандеги туолади. • Кизил қон танағаларини хаддан күп шишии анемия турини чакиради. Симптомларға баш оғриги, хансириш, баш айланышы, оқарини, терини сариқашашында күләнни оқарини. • Өк қон танағаларини сочини кайиши • Қон ишуванлыгы сеңкінлешін мүмкін. Сиз буни бурундан қон кетишилар ёки шинилишларда күзатылған мүмкін.

5. Ампулада БАКТОКС перорал күллаш учун супензия тайёрлаш учун кукуниң қандай сақлаш керак

Ушбу препараттадан болалар ололмайдын жойда саклаш керак.

Урмайда күрсатылған проклимат муддатында үткән ушбу препаратты күлламан. Тасыр муддатыннан үткән санаси күрсатылған ойнинг охирги кунига тааллукки.

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын


Саламаттық сактоо министрлігінин Дары-дармектер жана медициналык техникалар менен камсыздандыру департаментинин директоруну орун басарасы

Джанкорозова М.К. _____ 2019-ж.

КОШМО-БАРАКЧА: КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨР ҮЧҮН МААЛЫМАТ

**БАКТОКС 125 мг/5 мл. 250 мг/5 мл
500 мг/5 мл**

LABORATOIRE INNOVTECH INTERNATIONAL



ичип кабыл алу үчүн супензияны дағыдоғо порошок

Бул дарыны кабыл алууну баштоонун алдында аннотацияны толгуу менен көнүл буруп окуп чыгыныз.

Бул аннотацийны сактап көнүз. Сизге аны дагы окуп чыгуу зарыл болушу мүмкін.

• Эгер Сизде кандайдыр бир кошумча суроопор болсо, дарыгерден же фармацевттен сұраңын.

• Бул дары Сизге гана дайындалған. Аны башка адамдарга бербериге. Алардын оору белгилеги Сиздикене окош болсо дагы, аларға зыян көлтөрүштүрүш мүмкін.

• Эгер Сизде кандайдыр бир күйрүк натыйжа пайдо болсо, өзүнүзүн дарыгериниз менен же фармацевт менен көнешиниз. Мыйнай кының натыйжалар болу мүмкін. Сиз зудлық күрсатылғанда күнгил айланышынан күзатылған мүмкін.

5. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

Фармакетикалык тобу: Көнен чөрдөгүр таңсиздер - АТХ-коду (Анатомиялык, Дарылык, Химиалык классификация системасы боюнча коду): J01CA04

БАКТОКС деген эмне?

Бактос - антибиотик. Таасир берүүчү зат - амоксицилин. «Пеницилиндер» аталған дарылар тобуна кирет.

БАКТОКС деген эмне каратада колдонулат?

БАКТОКС денинен ар қандай белуктүрүнде бактериялар тараынан козголгон жүгүштуу ооруларды дарылоо учун колдонулат.

Ошондайда БАКТОКС ашкандайын жара оорусун дарылоо учун башка дарылар менен айкалышта колдонулады мүмкүн.

2. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

1. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошок деген эмне жана АЛ эмне карота колдонулат?

Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

2. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

3. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

4. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

5. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

6. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

7. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

8. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

9. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

10. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

11. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

12. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

13. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

14. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

15. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

16. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

17. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

18. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

19. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

20. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

21. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

22. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

23. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз.

24. Ампуладағы переоралдык майды бөлүкчелүү БАКТОКС үчүн порошокту күллаштырып көнүл буруп окуп чыгыныз