

ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА ДЕРМОБАКТЕР

Препаратнинг савдо номи: Дермобактер

Дори шакли: сиртга ва маҳаллий қўллаш учун эритма.

Таркиби:

100 мл эритма сақлайди:

Фаол моддалар: бензолконий хлоридини 50% ли эритмаси 985 мг, бу 500 мг бензалконий хлоридга тўғри келади, хлоргексидиндиглюконати 20% ли эритмаси 1065 мг, бу 200 мг хлоргексидин диглюконатга тўғри келади.

Ёрдамчи моддалар: бетаин кокоалкилдиметил 30% ли эритмаси, полоксамер 188, гидроксизилцеллюлоза, лимон кислотаси моногидрати, натрий цитрати, тозаланган сув.

Таърифи: бироз ёпишқоқ, чайқатилганида кўпирадиган, эфир ҳидига эга тиник, рангсиз суюқлик.

Фармакотерапевтик гуруҳи: антисептик восита.

АТХ коди: D08AC52

Фармакологик хусусиятлари

Бензалконий хлориди ва хлоргексидин кенг таъсир доирасига эга антисептик бўлиб, граммусбат ва грамманфий микроорганизмларга бактерицид таъсир кўрсатади, патоген замбуруғларга, шу жумладан *Candida albicans* туридаги ачитқисимонларга фунгицид таъсир кўрсатади. Антисептик таъсири 1 минут давомида намоён бўлади. Яллиғланишда ажраладиган ширада препаратнинг фаоллиги кам даражада пасаяди. Дермобактер тери қопламларини бутунлигини бузмасдан терини тозалайди ва дезинфекциялайди, тери юзасидан деярли сўрилмайди.

Қўлланилиши

Инфекцияланган тери ва шиллик пардаларни шикастланишларини, тери ва шиллик пардаларини (хавfli инфекцияланишини) тозалаш ва даволашда маҳаллий ва сиртга қўлланилади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- Препарат таркибига кирувчи фаол ва ёрдамчи моддаларга аллергия таъсирларда.
 - Қўз ва эшитиш йўлини шиллик қаватини ювиш учун ишлатилмасин.
 - Хирургик асбоблар ва мосламаларини дезинфекцияси учун қўлланмасин.
- Агарда сизга маълумотлар ноаниқ бўлса, албатта шифокор ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг.

Қўллаш усули ва дозалари

Сиртга қўллаш учун.

Эритма суюлтирилган ёки суюлтирилмаган ҳолда кунига 1-2 марта қўлланилади.

Тери юзасига ишлов бериш учун суюлтирилмаган эритма ишлатилади.

Шиллик қаватларга маҳаллий ишлов бериш учун сувда 1/10 нисбатида суюлтирилган эритма қўлланади. Суюлтирилган эритма бевосита қўллаш олдидан тайёрланади ва сақланмаслиги керак.

Эритма қўлланилгандан сўнг доим кўп миқдордаги сув билан яхшилаб ювилади.

Ножўя таъсирлари

Ҳар қандай бошқа препаратлар сингари бу препарат ҳам барча беморларда бўлмаса ҳам ножўя тасирга эга.

- Эритма яхшилаб сув билан ювиб ташланганида ўтиб кетувчи тери ва шиллик пардаларнинг қуруқлиги терини таъсирланиши.
- Даволаш курсининг бошида терининг озгина шикастланиши.
- Контактли экзема пайдо бўлиши.

- Чақалокларда кимёвий куйишлар (оралиқ номаълум)

Ўз шифокорингиз ва фармацевтингиздан ушбу йўриқномада бўлган ва бўлмаган ҳар қандай нохуш ёки ножўя кўринишлар тўғрисида хабардор қилинг ва маслаҳат сўранг.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бошқа маҳаллий антисептиклар билан бир вақтда қўллаш мумкин эмас (номутаносиблик ёки самарасизлик хавфи). Агар аввал совун ишлатилган бўлса, у яхшилаб ювиб ташланиши лозим. Агарда сиз бошқа дориларни қабул қилаётган, қабул қилган ёки қабул қилмоқчи бўлсангиз врач ёки фармацевтга хабар беринг.

Махсус кўрсатмалар

Сиртга ва маҳаллий қўллаш учун эритма.

Эритма билан терининг катта юзаларига ишлов берилганида (асосан куйган терига) ишлов беришда, эритмани герметик боғлов остига ишлатилганда, чала туғилган болаларга қўллашда эритманинг фаол моддаларини тизимли таъсир этиш хавфи бор.

Препаратни чақалоклар ва айниқса чала туғилган чақалокларга жуда эҳтиёткорлик билан қўллаш лозим.

“ДЕРМОБАКТЕР® сиртга қўллаш учун эритма” си орқали тери кимёвий куйиши мумкин.

Эҳтиёткорлик чоралари.

Препаратни қўлланмага мос равишда қўлланг ҳамда узок вақт давомида флакон қопқоғини очиқ ҳолатда қолдирилганида, айниқса таркиби 250 мл ли флакондан кўп бўлса бактериал зарарланиш ҳолати юз бериши мумкин.

Агарда сизга маълумотлар ноаниқ бўлса, албатта шифокор ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг.

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўллаш.

Бу препаратни эмизиш даврида кўкрак атрофига қўллаш мумкин эмас.

Препаратни қўллашдан олдин агарда сиз хомиладор ва эмизикди даврда булсангиз, хомиладорман деб уйласангиз ёки фарзандли булишни режалаштирган булсангиз албатта шифокор ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг.

Дори воситасини транспорт воситалари ёки потенциал хавфли механизмларни бошқариш қобилиятига таъсир этиш хусусияти

Таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборганда нохуя таъсирлар келтириб чиқариши мумкин. Бундан ташқари, агар препарат билан терининг катта юзаларига ишлов берилганида, эритмани герметик боғлов остига ишлатилганда, эритманинг фаол моддаларини тизимли таъсир этиш хавфи мавжудлиги инкор этмаслик керак.

Чиқарилиш шакли

Оқ рангли пластмассали таглик қўйилган буралувчи пластмасса қалпоқли, ҳажми 125 мл ёки 300 мл ли жигарранг тиниқ пластмасса флакон. бир флакондан картон қутида қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар олаолмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлилик муддатининг тугаши кўрсатилган ойнинг сўнгги куни ҳисобланади.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Қайд этиш гувоҳномасининг эгаси

Лаборатория Иннотек Интернациональ, Франция
22, авеню Аристид Бриан, 94110, Аркей

Ишлаб чиқарувчи

Иннотера Шузи,
Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис 41150, Франция.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасининг сифатига ва шикоят (таклиф)га жавоб берувчи ташкилот номи ва манзили

“Лаборатория Иннотек Интернациональ” Ўзбекистонда ваколатхонаси

Юридик манзили: Тошкент, Зульфийхоним кўчаси 1А. Тел: 140-43-40, 140-43-41

E-mail: uz.innotech@sks.uz