

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М. К.
« » _____ 201_ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ФАРМАТЕКС®

Торговое название:
ФАРМАТЕКС®

Международное непатентованное название:
Бензалкония хлорид

Лекарственная форма:
Суппозитории вагинальные

Состав:
Один суппозиторий содержит
Активное вещество- бензалкония хлорида раствор 50% 37,8 мг, что соответствует бензалконию хлориду 18,9 мг.
Вспомогательные вещества: гидроксипропилцеллюлоза, твердый жир, Витепсол S51

Описание
Суппозитории цилиндрической формы с конусообразным концом, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа
Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний. Контрацептивы для местного применения. Интравагинальные контрацептивы.
Код АТХ: G02BB

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Бензалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища. Он абсорбируется лишь на поверхности стенок влагалища и затем выводится с нормальными физиологическими выделениями или устраняется простым промыванием водой.

Фармакодинамика

Бензалкония хлорид является одновременно спермицидом и антисептиком. Действующее вещество разрушает мембраны сперматозоидов. Разрушение сперматозоидов происходит в два этапа: вначале разрушение жгутика, затем разрыв головки, что обуславливает невозможность оплодотворения. Эффективность метода зависит от правильности и точности соблюдения рекомендаций по применению. Сапрофитная флора под воздействием контрацептива не меняется – Фарматекс® не влияет на количество лактобацилл (палочек Додерляйна). Не являясь гормональным препаратом, Фарматекс® не влияет на менструальный цикл, либидо, фертильность.

Бензалкония хлорид также проявляет антисептическую активность:

- In vitro*, препарат активен в отношении возбудителей инфекций, передающихся половым путем, а именно: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Herpes simplex тип 2, ВИЧ, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Тем не менее, он неактивен в отношении Mycoplasma spp. и низко активен в отношении Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi и Treponema pallidum.
- In vivo*, некоторые элементы активны в отношении возбудителей некоторых заболеваний, передающихся половым путем. Информация по применению в качестве профилактического средства отсутствует.

Показания к применению

Местная контрацепция для любой женщин репродуктивного возраста, не имеющей к этому противопоказаний, а так в случаях:

- при наличии временных или абсолютных противопоказаний к применению гормональных контрацептивов или внутриматочной спирали (ВМС)
- в период после родов и во время кормления грудью
- в период, предшествующий менопаузе
- при необходимости эпизодического предохранения от беременности
- в качестве дополнительной местной контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы, цервикального колпачка или внутриматочной спирали (особенно при длительном применении лекарственных препаратов таких как нестероидные противовоспалительные средства).
- в качеств дополнительного метода контрацепции при пропуске или опоздании в приеме пероральных гормональных контрацептивов. В этом случае рекомендуется сочетать оба метода контрацепции на протяжении оставшихся дней менструального цикла.

Способ применения и дозы

Для вагинального применения.

В положении лежа на спине, суппозитории вводят глубоко во влагалище, не позднее, чем за 5 минут до полового акта. Длительность действия препарата – 4 часа. Обязательно вводить новый суппозиторий перед каждым повторным половым актом.

Разовая доза: один суппозиторий рассчитан на один половой акт. Кратность использования ограничена индивидуальной переносимостью действующего вещества и частотой половых актов.

Возможно применение Фарматекса совместно с влагалищной диафрагмой или ВМС.

Сразу после полового акта допустим только туалет наружных половых органов простой водой.

Побочные действия

- Аллергические реакции, контактный дерматит, зуд и жжение у одного или обоих партнеров.

- В случае их возникновения прекратить использование Фарматекса.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- кольпит, вагинит
- изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и матки
- невозможность правильного применения Фарматекса у лиц с нарушениями психики или лиц, не допускающих любые вмешательства на половых органах, которые препятствуют использованию контрацептива
- любому лицу, не способному понять или согласиться с этим видом контрацепции.

Лекарственные взаимодействия

Любое средство, введенное во влагалище, может инактивировать местное спермицидное действие Фарматекса. Действующее вещество- бензалкония хлорид, разрушается мылом, поэтому запрещается использование мыла для туалета половых органов, даже в минимальных количествах.

Особые указания

Фарматекс является эффективным препаратом для предохранения от беременности при условии его правильного применения. Однако, метод спермицидной местной контрацепции всегда менее эффективен, по сравнению с гормональной контрацепцией, внутриматочными контрацептивами, диафрагмой, цервикальным колпачком или презервативом. Эффективность контрацепции связана исключительно со строгим соблюдением правил его использования.

- Применять систематически перед каждым половым актом
- Запрещается использование мыла для туалета половых органов для обоих партнеров за 2 часа до полового акта и в течение 2-х часов после полового акта, т.к. мыло, даже в остаточных количествах, разрушает действующее вещество Фарматекса.
- Сразу после полового акта возможен только туалет наружных половых органов только простой водой. Прежде чем делать влагалищное орошение, следует подождать в течение 2-х часов после полового акта.
- С Фарматексом, введенным во влагалище, нельзя принимать ванны, купаться в море, бассейне и водоемах во избежание снижения его контрацептивного действия.
- В случае если возникает необходимость лечения заболеваний влагалища и/или назначения какого-либо другого лекарственного средства вагинально, необходимо дождаться конца лечения прежде, чем возобновлять (начинать) контрацепцию с помощью Фарматекса.
- Данный метод контрацепции не защищает от инфекций, передающихся половым путем или вызванных вирусом иммунодефицита человека. От этих заболеваний есть только один метод барьерной контрацепции- презерватив.

Беременность и период лактации

Какого- либо вредного воздействия, связанного с использованием препарата во время беременности, обнаружено не было: экспертиза тератогенных свойств конечного продукта дала отрицательные результаты, так же как и экспертиза тератогенных свойств самого действующего вещества.

Проникновение в материнское молоко возможно в крайне незначительном количестве без каких- либо известных негативных последствий. Препарат может применяться в период грудного вскармливания.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Не влияет.

Передозировка

Не выявлена.

Форма выпуска и упаковка

По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению. На государственном и на русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Юнитер Ликвид Мануфэжчуринг, Франция

Выпускающий контроль качества

Иннотера Шузи, Рю Рене Шантеро, Шузи-Сюр-Сис, 41150 Валуар-сюр-Сис, Франция

Владелец регистрационного удостоверения

Лаборатория Иннотек Интернациональ, Франция

Организация, принимающая претензии на территории Кыргызской Республики:

ОсОО «Промо-сервис» 720 044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова д.61/24

тел.: +996 (555) 97-90-39

e-mail: dilyara.SHAKIROVA.consultant@innothera.com

www.innotech.ru

ФАРМАТЕКС

ДОРИ ВОСИТАСИНИ ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Савдо номи: Фарматекс

Халқаро патенланмаган номи (ХПН): Бензалконий хлориди

Дори шакли: Қин суппозиторийлари

Таркиби:

1 суппозиторий сақлайди

Фаол модда - 37,8 мг бензалконий хлоридининг 50% суви эритмаси, бу 18,9 мг бензалконий хлоридига мос келади

Ёрдамчи моддалар: Гипролоза, Witepsol S 51 қаттиқ ёғи

Таърифи: Оқ рангли, цилиндрик шаклли, охири конуссимон суппозиторийлар.

Фармакотерапевтик гурухи: Гинекологик касалликларни даволашда бошқа дори воситалари. Маҳаллий қўллаш учун контрацептивлар. Интравагинал контрацептивлар.

АТХ коди: G02BB

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Бензалконий хлориди бир вактнинг ўзида спермицид ва антисептик восита ҳисобланади. Фаол модда сперматозоидларнинг мембранасини парчалайди. Сперматозоидларнинг парчаланishi икки босқичда кечади: дастлаб думини, сўнгра бошчасини, бу шикастланган сперматозоид томонидан тухум хужайрани урўғланиш имконини йўқ бўлишига олиб келади.

Усулнинг самарадорлиги қўлланиш бўйича тавсияларни тўлиқ ва аниқ риюя этилишига боғлиқ.

Қиннинг сапрофит флораси контрацептивлар таъсирида ўзгармайди - Фарматекс лактобацилллар (Додерляйн таёкчасига) микдорига таъсир қилмайди.

Фарматекс гормонал препарати эмас ва хайз даври, либидо ва аёллар фертил даврига таъсир кўрсатмайди.

Бензалконий хлориди антисептик таъсирига ҳам эга:

- *In vitro* шароитида, препарат жинсий йўли билан ўтадиган касалликларга нисбатан фаол, айниқса: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 2 типи, Staphylococcus aureus. Mycoplasma spp. га таъсир қилмайди ва Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi ва Treponema pallidum га суст таъсир қилади.

- *In vivo* шароитида, баъзи элементлар жинсий йўли билан ўтадиган касалликларга нисбатан фаол. Профилактик сифатида фойдаланиш тўғрисида маълумотлар йўқ.

Фармакокинетикаси

Бензалконий хлориди кин шиллик каватидан сўрилмайди, оддий сув билан ювилганда баргараф қилинади ва нормал физиологик ажралмалар билан чиқарилади.

Қўлланилиши

Репродуктив ёшдаги аёллар учун маҳаллий контрацепция, айниқса:

- перорал контрацептивлар ва бачадон ички контрацепциясини қўллаш мумкин бўлмаганда;
- туғруқдан кейинги даврда, лактация даврида, хомиладорликни тўхтатишда,
- менопаузада;
- мунтазам бўлмаган жинсий алоқаларда;
- кин диафрагмаси ёки бачадон ичи спирали қўлланганда қўшимча маҳаллий контрацепция сифатида қўлланилади.
- доимий қўлланиладиган перорал контрацептивларни қабул қилишни ўтказиб юбориш ёки кечикишда. Бу ҳолатда хайз давригача бўлган кун давомида икки турдаги контрацепцияни қўллаш тавсия этилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Қин ичига қўллаш учун.

Чалқанча ётган ҳолда, суппозиторийни жинсий алоқадан 5 минут олдин қинга чуқур юборилади. Таъсирининг давомийлиги – 4 соат. Ҳар бир такрор жинсий алоқадан олдин албатта янги капсулани юбориш керак.

Ножўя таъсирлари

- Аллертик реакциялар, контакт дерматит, кин ва/ёки шеригининг жинсий олатида қичишиш ва ачишиш, оғриқли сийиш.

- Улар пайдо бўлиши ҳолларида Фарматексни қўллашни тўхтатилсин.

Кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик
- кольпит, вагинит
- кин ёки бачадон бўйни шиллик каватини яраланиши ва таъсирланишида
- рухий касалликлар билан оғриган одамларда ёки контрацептив совиталардан фойдаланишга тўскинлик киладиган жинсий аъзоларда аралашувларга йўл кўймаган шахсларда

Дориларнинг ўзаро таъсири

Қин ичига кўлланиладиган ҳар қандай дори воситаси препаратнинг спермицид таъсирини пасайтириши мумкин. Фаол модда - бензалконий хлорид совун таъсирида парчаланеди, шунинг учун хаттоки кам миқдорда бўлса ҳам жинсий аъзоларни тозалаш учун совундан фойдаланиш таъкиккланади.

Махсус кўрсатмалар

Фарматекс хомиладорликдан сақланиш учун самарали препаратдир, агар препарат тўғри кўлланилса. Бирок, спермицид маҳаллий контрацепцияси доим гормонал контрацепцияси, бачадон ички контрацепцияси, қин диафрагмаси, цервикал копкоғи ёки презервативларга нисбатан доим самарасиз. Контрацепциянинг самарадорлиги препаратни тўғри кўллашга боғлиқ.

- Ҳар бир жинсий алоқадан олдин мунтазам равишда кўлланилади
- Жинсий алоқадан 2 олдин ва кейин жинсий аъзоларни тозалаш учун совундан фойдаланиш таъкиккланади, чунки совун Фарматекснинг таъсир килувчи моддасини парчалайди.
- Жинсий алоқадан кейин фақат тоза сув билан ташки жинсий аъзоларни тозалаш мумкин. Жинсий алоқадан 2 соатдан кейин кинни тозалаш мумкин.
- Қинга юборилган Фарматекснинг контрацептив таъсирини пасайиши хавфи сабабли ванна қабул қилиш денгизда, бассейнда ва сув хавзаларида чўмилиш мумкин эмас.
- Қин касалликларини даволашда қин дори воситалари билан даволаш тўхтамағунигача Фарматексни кўллашни вақтинча тўхтатиш керак.

Бу контрацепция усули жинсий алоқа йўли билан ўтадиган ёки Одам иммун танқислиги вируси сабаб бўлган инфекциялардан ҳимоя қилмайди. Ушбу касалликлардан фақат тўсиқли контрацептив усули –презерватив мавжуд.

Ҳомиладорлик ва лактация даври

Препарат контрацептив восита ҳисобланади, хомиладорлик вақтида кўлланмайди. Хомиладорлик вақтида бу спермицидни тасодифан кўлланганда, хомилага ҳеч қандай салбий таъсирлар аниқланмаган.

Онанинг сutigа кириб бориши жуда кам миқдорда маълум салбий таъсирлар кўрсатмасдан амалга оширилиши мумкин. Препаратни лактация даврида кўллаш мумкин.

Транспорт воситаларини бошқариш қобилиятига таъсири
Таъсири йўқ.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошриб юборилиши ҳоллари аниқланмаган.

Чиқарилиш шакли

Қин суппозиторийлари.
5 суппозиторийдан қуйи зичликка эга полиэтилен билан қопланган ПВХ плёнка стрипда.
1 ёки 2 стрип кўллаш бўйича йўриқномаси билан қартон қутида.

Сақлаш шароити

25 °С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин

Яроқлилик муддати

3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Лаборатория Иннотек Интернациональ

22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция

Ишлаб чиқарилган: Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-Сюр-Сис 41150 Валуар-сюр-Сис, Франция



БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Дары-дармектер жана медициналык техникалар менен камсыздандыруу департаментинин директорунун орун басары
Джанкорозова М.К. _____
« ____» _____ 2019-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ
БОЮНЧА НУСКАМА
ФАРМАТЕКС®

Соодагагы аталышы:

ФАРМАТЕКС®

Эл аралык патенттелбеген аталышы:

Бензалконий хлориди

Дарынын түрү:

Кын суппозиторийлери

Курамы:

Бир суппозиторий камтыйт
Активдүү зат - 50% 37,8 мг *бензалконий хлоридинин эритмеси, бул 18,9 мг бензалконий хлоридке туура келет. Көмөкчү заттар:* гидроксипропилцеллюлоза, катуу май, Витепсол S51

Сүрөтгөмөсү

Цилиндр формасындагы конус сымал учу менен ак түстөгү суппозиторийлер.

Фармадарылык тобу

Гинекологиялык ооруларды дарылоо үчүн башка дарылар. Жергиликтүү колдонуу үчүн контрацептивдер. Интравагиндик контрацептивдер. Код АТХ: G02BB

Фармакологиялык касиеттери

Фармакокинетикасы

Бензалконий хлоридинин жыныс кынынын былжырлуу чел убакыгына сиңбейт. Ал былжырлуу чел кабыктын керегесинде үстүргөн гана синет жана андан кийин нормалдуу физиологиялык жол менен бөлүнүп чыгат же суу менен жууп кетирилет.

Фармакодинамикасы

Бензалконий хлорид бир эле убакытта спермицид жана антисептик болуп эсептелет. Таасир берүүчү зат сперматозоиддердин мембранасын бузат. Сперматозоиддердин бузулуусу 2 этапта жүрөт: башында чачыктардын бузулуусу, андан кийин баштын ажыроосу, бул уруктануунун мүмкүн эместигин шарттайт. Ыкманын натыйжалуулугу колдонуу боюнча сунуштоону туура жана так аткарылышына көз каранды. Сапрофиттик флора контрацептивдин таасири алдында өзгөрбөйт – Фарматекс® лактобацилдин санына таасир бербейт (Доделрияна таякчалары). Гормоналдык дары болбогондуктан, Фарматекс® айыз циклына, либидо, фертилдүүлүккө таасир тийгизбейт. Бензалконий хлориди ошондой эле антисептикалык активдүүлүк көрсөтөт:

- *In vitro*, жыныс жолу аркылуу өтүүчү инфекциялардын козгогучтарына карата дары активдүү, атап айтканда: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Herpes simplex 2 тиб, АИВ, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Мындан тышкары, ал Mycoplasma spp. карата активдүү эмес жана Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi жана Treponema pallidum карата төмөнкү активдүүлүктө.
- *In vivo*, кээ бир элементтер жыныс жолу аркылуу өтүүчү кээ бир оорулардын козгогучтарына карата активдүү. Алдын алуучу каражат катары колдонуу боюнча маалымат жок.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Репродуктивдик курактагы каршы көрсөтмөлөрү жок баардык айымдарга жергиликтүү контрацепция, негизи төмөнкү учурларда:
-гормоналдык контрацептивдерди же жатын ичине эшилмелерди колдонууга убактылуу же абсолюттук каршы көрсөтмөлөрү бар болгон учурда (ЖИЭ)
- төрөтөн кийинки мезгил жана бала эмизүү учуру - в период, предшествующий менопаузе
- кошбойлуулуктан мезгил-мезгили менен сактануу зарылчылыгында
- кын диафрагмасын колдонууда жергиликтүү кошумча контрацепция катары, цервикалдык капкакча же кын ичине эшилмелерди (өзгөчө стероидлик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар сыяктуу дары-дармектерди узак колдонууда).
- переоралдуу гормоналдык контрацептивдерди өткөрүп жибергенде же кабыл алуудан кечигүүдө контрацепциянын кошумча ыкмасы катары. Мындай учурда контрацепциянын эки ыкмасын тең айыз циклынын калган күндөрүндө айкалыштыруу сунушталат.

Колдонуу жолу жана дозасы

Кынга колдонуу үчүн.

Чалкасынан жаткан абалда, жыныстык катнашка чейин 5 минуттан кем эмес суппозиторийди кынга терең киргизет. Дарынын таасир берүү узактыгы – 4 саат. Милдеттүү түрдө ар бир кайталанган жыныстык катнаштын алдында жаңы суппозиторий киргизүү керек.

Бир жолку доза: бир суппозиторий бир жыныстык катнашка эсептелген. Колдонуунун кайталануусу таасир берүүчү затты жеке көтөрө албастыкка жана жыныстык катнаштын жыштыгына чектелүү. Фарматексти колдонуу кын диафрагмасы же ЖИЭ менен бирге колдонууга болот. Жыныстык катнаштан кийин дароо жуу жыныстык органдардын сыртын гана таза суу менен мүмкүн.

Кыйыр таасирлери

- Аллергиялык реакциялар, байланыш дерматити, кычышуу жана ачышуу бирөөндө же эки өнөктөштө тең.
- Алардын пайда болуусунда Фарматексти колдонууну токтотуу керек.

Каршы көрсөтмөсү

- дарынын курам бөлүктөрүнө жогорку сезгичтик

- кольпит, вагинит

- жатындын жана кындын былжырлуу чел кабыктарынын жаралануусу жана кычышуусу

- психиканын бузулуусу менен адамдарда же жыныс органдарына ар кандай жыныстык кийлигишүүгө жол бербей, контрацептиви колдонууга тоскоол жараткан адамдарда Фарматексти туура колдонууга мүмкүн эместиги
- контрацепциянын бул түрүн түшүнө же макул боло албаган ар адамга.

Дарылык өз ара таасири

Кынга салынган ар бир каражат Фарматекстин жергиликтүү спермициддик таасиринин активдүүлүгүн жок кылышы мүмкүн. Таасир берүүчү зат - бензалконий хлориди, самын менен бузулат, ошондуктан жыныс органдарын жуу үчүн самынды минималдуу өлчөмдө дагы колдонууга тыюу салынат.

Өзгөчө көрсөтмөлөрү

Фарматекс туура колдонуу шартында кош бойлуулуктан сактанууга натыйжалуу дары болуп эсептелет. Бирок, спермициддик жергиликтүү контрацепция ыкмасы гормоналдык контрацепцияга, жатын ичине контрацептиваларга, диафрагмага, цервикалдык капкакчага же презервативке салыштырмалуу дайыма натыйжасы төмөрөөк.
Контрацепциянын натыйжалуулугу анын колдонуу эрежелерин катуу сактоо менен байланыштуу.

- Ар бир жыныстык катнаштын алдында систематикалык колдонуу
- Жуунуу үчүн жыныстык катнашка чейинки 2 саатта жана жыныстык катнаштан кийинки 2 саат ичинде самын колдонууга болбойт, анткени анын калып калган калдыгы да Фарматекс дарысынын таасир берүүчү затын бузат.
- Жыныстык катнаштан кийин жыныс органынын сыртынан таза суу менен гана жууга болот. Кынды жуу (чайкоо) алдында жыныстык катнаштан кийин 2 саат аралыгын күтүү зарыл.
- Кынга куюлган Фарматекс дарысы менен, анын контрацептивдик таасирин төмөндөтүү коркунучун четтетүү үчүн ваннага жууну жана деңизге, бассейнге жана суусактагычтарда түшүүгө болбойт.
- Кын ооруларын дарылоо жана/же кандайдыр бир кынга башка дары каражатын дайындоо зарылчылыгы пайда болгон учурда Фарматекстин жардамы менен контрацепцияны жаңылантуу (баштоо) алдында дарыланып бүткөнгө чейин күтүү керек.
- Контрацепциянын бул ыкмасы жыныс жолу менен өткөн же адамдын имундук жетишсиздигинен козголгон вирустук инфекциядан коргойт. Бул оорулардан бир гана коргоочу контрацепция ыкмасы бар – презерватив.

Кош бойдуулук жана бала эмизүү мезгили

Кош бойлуулук мезгилинде дарыны колдонуу менен байланышкан кандайдыр бир зыяндуу таасир байкалган эмес: акыркы продуктунун тератогендик касиеттеринин экспертизасы таасир берүүчү заттын өзүнүн тератогендик касиеттеринин экспертизасы сыяктуу эле терс жыйынтыктарды берди. Эне сүтүнө ааз өлчөмдө кандайдыр бир белгилүү жагымсыз жыйынтыксыз өтүшү мүмкүн. Дары бала эмизүү мезгилинде колдонулушу мүмкүн.

Унаа каражаттарын же потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө тийгизген таасиринин өзгөчүлүктөрү.
Таасир бербейт.

Ашыкча доза

Аныкталган эмес.

Чыгаруу формасы жана таңгакчасы

5 суппозиторийден уячалуу поливинилхлорид жукасынан жана алюминь фальгасынан картон таңгакчага салынат. 2 контурлуу уячалуу таңгакчада медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге. Мамлекеттик жана орус тилдеринде картон кутучасына салышат.

Сактоо шарты

25 °С дан жогору эмес аба табында сактоо зарыл.

Балдар жетбеген жерде сактоо керек!

Сактоо мөөнөтү

3 жыл

Таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Дарыканалардан берүү шарты

Рецепти жок.

Өндүрүүчү

Юнитер Ликвид Мануфэчуринг, Франция

Сапатын көзөмөлдөп чыгаруучу

Иннотера Шузи, Рю Рене Шантеро, Шузи-Сюр-Сис, 41150 Валуар-сюр-Сис, Франция

Каттоо күбөлүгүнүн ээси

Иннотек Интернациональ лаборатория, Франция

Кыргыз Республикасынын аймагында арыз-доолорду кабыл алуучу уюм:

«Промо-сервис» ЖЧК 720 044, Бишкек ш., Ч. Айтматова пр. 61/24 үй.

тел.: +996 (555) 97-90-39

e-mail: dilyara.SHAKIROVA.consultant@innothera.com

www.innotech.ru