

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М. К.
«__» _____ 201__ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ФАРМАТЕКС®

Торговое название:
ФАРМАТЕКС®

Международное непатентованное название:
Миристалкония хлорид

Лекарственная форма:
Таблетки вагинальные

Состав:
Активное вещество- миристалкония хлорид 20, 0 мг.
Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, кислота лимонная безводная, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, макрогол 6000.

Описание
Круглые белые таблетки с отверстием в центре.

Фармакотерапевтическая группа
Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний. Контрацептивы для местного применения. Интравагинальные контрацептивы.
Код АТХ G02BB

Фармакологические свойства
Фармакокинетика
Миристалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища. Он абсорбируется лишь на поверхности стенок влагалища и затем выводится нормальными физиологическими выделениями или устраняется простым промыванием водой.

Фармакодинамика
Миристалкония хлорид является одновременно спермицидом и антисептиком. Действующее вещество разрушает мембраны сперматозоидов. Разрушение сперматозоидов происходит в два этапа: вначале разрушение жгутика, затем разрыв головки, что обуславливает невозможность оплодотворения. Эффективность метода зависит от правильности и точности соблюдения рекомендаций по применению.

Сапрофитная флора под воздействием контрацептива не меняется – Фарматекс® не влияет на количество лактобацилл (палочек Додерляйна). Не являясь гормональным препаратом, Фарматекс® не влияет на менструальный цикл, либидо, фертильность.

Миристалкония хлорид также проявляет антисептическую активность:

- *In vitro*, препарат активен в отношении возбудителей инфекций, передающихся половым путем, а именно: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Herpes simplex тип 2, ВИЧ, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Тем не менее, он неактивен в отношении Mycoplasma spp. и низко активен в отношении Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi и Treponema pallidum;
- *In vivo*, некоторые элементы активны в отношении возбудителей некоторых заболеваний, передающихся половым путем. Информации по применению в качестве профилактического средства отсутствует.

Показания к применению
Местная контрацепция для любой женщин репродуктивного возраста, не имеющей к этому противопоказаний, а так в случаях:

- при наличии временных или абсолютных противопоказаний к применению гормональных контрацептивов или внутриматочной спирали (ВМС)
- в период после родов и во время кормления грудью
- в период, предшествующий менопаузе

- при необходимости эпизодического предохранения от беременности
- в качестве дополнительной местной контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы, цервикального колпачка или внутриматочной спирали (особенно при длительном применении лекарственных препаратов таких как нестероидные противовоспалительные средства).
- в качестве дополнительного метода контрацепции при пропуске или опоздании в приеме пероральных гормональных контрацептивов. В этом случае рекомендуется сочетать оба метода контрацепции на протяжении оставшихся дней менструального цикла.

Способ применения и дозы
Для вагинального применения.
В положении лежа на спине, смоченную водой таблетку вводят глубоко во влагалище не позднее, чем за 10 минут до полового акта. Длительность действия – 3 часа. Обязательно вводить новую таблетку перед каждым повторным половым актом.
Разовая доза: одна таблетка рассчитана на один половой акт. Кратность использования ограничена индивидуальной субъективной переносимостью действующего вещества и частотой половых актов. Возможно применение Фарматекса совместно с влагалищной диафрагмой или ВМС.
Сразу после полового акта допустим только туалет наружных половых органов простой водой.

Побочные действия
- Аллергические реакции, контактный дерматит, зуд и жжение у одного или обоих партнеров.
- В случае их возникновения прекратить применение препарата Фарматекса.

Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- кольпит, вагинит
- изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и матки
- невозможность правильного применения Фарматекса у лиц с нарушениями психики или лиц, не допускающих любые вмешательства на половых органах, которые препятствуют использованию контрацептива
- любому лицу, не способному понять или согласиться с этим видом контрацепции.

Лекарственные взаимодействия
Любое средство, введенное во влагалище, может инактивировать местное спермицидное действие Фарматекса. Действующее вещество-миристалкония хлорид, разрушается мылом, поэтому запрещается использование мыла для туалета половых органов, даже в минимальных количествах.

Особые указания
Фарматекс является эффективным препаратом для предохранения от беременности при условии его правильного применения. Однако, метод спермицидной местной контрацепции всегда менее эффективен, по сравнению с гормональной контрацепцией, внутриматочными контрацептивами, диафрагмой, цервикальным колпачком или презервативом.
Эффективность контрацепции связана исключительно со строгим соблюдением правил его использования.

- Применять систематически перед каждым половым актом
- Запрещается использование мыла для туалета половых органов для обоих партнеров за 2 часа до полового акта и в течение 2-х часов после полового акта, т.к. мыло, даже в остаточных количествах, разрушает действующее вещество Фарматекса.
- Сразу после полового акта возможен только наружный туалет половых органов только простой водой. Прежде чем делать влагалищное орошение, следует подождать в течение 2-х часов после полового акта.
- С Фарматексом, введенным во влагалище, нельзя принимать ванны, купаться в море, бассейне и водоемах во избежание снижения его контрацептивного действия.
- В случае если возникает необходимость лечения заболеваний влагалища и/или назначения какого-либо другого лекарственного средства вагинально, необходимо дождаться конца лечения прежде, чем возобновлять (начинать) контрацепцию с помощью Фарматекса.

- Данный метод контрацепции не защищает от инфекций, передающихся половым путем или вызванных вирусом иммунодефицита человека. От этих заболеваний есть только один метод барьерной контрацепции-презерватив.

Беременность и период лактации
Какого-либо вредного воздействия, связанного с использованием препарата во время беременности, обнаружено не было: экспертиза тератогенных свойств конечного продукта дала отрицательные результаты, так же как и экспертиза тератогенных свойств самого действующего вещества.
Проникновение в материнское молоко возможно в крайне незначительном количестве без каких-либо известных негативных последствий. Препарат может применяться в период грудного вскармливания.
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.
Не влияет.

Передозировка
Не выявлена.

Форма выпуска и упаковка
По 12 таблеток помещают в тубы пилипропиленовые, закрытые пробкой из полиэтилена с силикагелем.
По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и на русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения
3 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
Иннотера Шузи Рю Рене Шантеро Шузи-сюр-Сис 41150 Валуар-сюр-Сис, Франция

Организатор-упаковщик
Страдис- Франция

Владелец регистрационного удостоверения
Лаборатория Иннотек Интернациональ, Франция

Организация, принимающая претензии на территории Кыргызской Республики:
ОсОО «Промо-сервис» 720 044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова д.61/24
тел.: +996 (555) 97-90-39
e-mail: Dilyara.SHAKIROVA.consultant@innothera.com
www.innotech.ru

БЕКИТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Дары-дармектер жана медициналык
техникалар менен камсыздандыруу
департаментинин директорунун
орун басары
Джанкорозова М.К.
«__» _____ 2019-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА

ФАРМАТЕКС®

Соодадагы аталышы:
ФАРМАТЕКС®

Эл аралык патенттелбеген аталышы:
Миристалконий хлориди

Дарынын түрү:
Кын таблеткалары

Курамы:
Активдүү зат - 20, 0 мг *миристалконий хлориди.*
Көмөкчү заттар: гидрокарбонат натрий, суусуз лимон кислотасы, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, магний стеарат, микрокристалдык целлюлоза, лактоза моногидрат, макрогол 6000.

Сүрөттөмөсү
Тегерек борборунда тешиги менен ак таблеткалар.

Фармадарылык тобу
Гинекологиялык ооруларды дарылоо үчүн башка дарылар. Жергиликтүү колдонуу үчүн контрацептивдер. Интравагиндык контрацептивдер.
Код АТХ: G02BB

Фармакологиялык касиеттери
Фармакокинетикасы
Миристалконий хлориди жыныс кынынын былжырлуу чел кабыгына сиңбейт. Ал былжырлуу чел кабыктын керегесинде үстүртөн гана сиңет жана андан кийин нормалдуу физиологиялык жол менен бөлүнүп чыгат же суу менен жууп кетирилет.

Фармакодинамика
Миристалконий хлориди бир эле убакытта спермицид жана антисептик болуп эсептелет. Таасир берүүчү зат сперматозоиддердин мембранасын бузат. Сперматозоиддердин бузулуусу 2 этапта жүрөт: башында чачыктардын бузулуусу, андан кийин баштын ажыроосу, бул уруктануунун мүмкүн эместигин шарттайт. Ыкманын натыйжалуулугу колдонуу боюнча сунуштоону туура жана так аткарылышына көз каранды. Сапрофиттик флора контрацептивдин таасири алдында өзгөрбөйт – Фарматекс® лактобацилдин санына таасир бербейт (Додерляйна таякчалары).

Гормоналдык дары болбогондуктан, Фарматекс® айыз циклына, либидо, фертилдүүлүккө таасирин тийгизбейт.
Миристалконий хлориди ошондой эле антисептикалык активдүүлүк көрсөтөт:

- *In vitro*, жыныс жолу аркылуу өтүүчү инфекциялардын козгогучтарына карата дары активдүү, атап айтканда: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Herpes simplex 2 тиб, АИВ, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Мындан тышкары, ал Mycoplasma spp. карата активдүү эмес жана Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi жана Treponema pallidum карата төмөнкү активдүүлүктө.

- *In vivo*, көз бир элементтер жыныс жолу аркылуу өтүүчү кээ бир оорулардын козгогучтарына карата активдүү. Алдын алуучу каражат катары колдонуу боюнча маалымат жок.

Колдонууга көрсөтмөлөр
Репродуктивдик курактагы каршы көрсөтмөлөрү жок баардык айымдарга жергиликтүү контрацепция, негизи төмөнкү учурларда:

- гормоналдык контрацептивдерди же жатын ичине эшилмелерди колдонууга убактылуу же абсолюттук каршы көрсөтмөлөрү бар болгон учурда (ЖИЭ)
- төрөттөн кийинки мезгил жана бала эмизүү учуру - в период, предшествующий менопаузе
- кошбойлуудан мезгил-мезгили менен сактануу зарылчылыгында
- кын диафрагмасын колдонууда жергиликтүү кошумча контрацепция катары, цервикалдык капкачка же кын ичине эшилмелерди (өзгөчө стероиддик эмес сегзгөнүүгө каршы каражаттар сыяктуу дары-дармектерди узак колдонууда).
- переоралдуу гормоналдык контрацептивдерди өткөрүп жибергенде же кабыл алуудан кечигүүдө контрацепциянын кошумча ыкмасы катары. Мындай учурда контрацепциянын эки ыкмасын тең айыз циклынын калган күндөрүндө айкалыштыруу сунушталат.

Колдонуу жолу жана дозасы
Кынга колдонуу үчүн.
Чалкасынан жаткан абалда, жыныстык катнашка чейин 10 минуттан кем эмес суу менен сууланган таблетканы кынга терең киргизет. Дарынын таасир берүү узактыгы – 3 саат. Милдеттүү түрдө ар бир кайталанган жыныстык катнаштын алдында жаңы таблетка киргизүү керек.

Бир жолку доза: бир таблетка бир жыныстык катнашка эсептелген. Колдонуунун кайталануусу таасир берүүчү затты жеке субъективдүү көтөрүмдүүлүнө жана жыныстык катнаштын жыштыгына чектелүү. Фарматексти кын диафрагма же ЖИЭ менен бирге колдонууга болот. Жыныстык катнаштан кийин дароо жуу жыныстык органдардын сыртын гана таза суу менен мүмкүн.

Кыйыр гаасирлери

- Аллергиялык реакциялар, байланыш дерматити, кычышуу жана ачышуу бирөөндө же эки өнөктөштө тең.

- Алардын пайда болуусунда Фарматексти колдонууну токтотуу керек.

Каршы көрсөтмөсү

- дарынын курам бөлүктөрүнө жогорку сезгичтик

- кольпит, вагинит

- жатындын жана кындын былжырлуу чел кабыктарынын жаралануусу жана кычышуусу

- психиканын бузулуусу менен адамдарда же жыныс органдарына ар кандай жыныстык кийлигишүүгө жол бербей, контрацептиви колдонууга тоскоол жараткан адамдарда Фарматексти туура колдонууга мүмкүн эместиги

- контрацепциянын бул түрүн түшүнө же макул боло албаган ар адамга.

Дарылык өз ара таасири

Кынга салынган ар бир каражат Фарматекстин жергиликтүү спермициддик таасиринин активдүүлүгүн жок кылышы мүмкүн. Таасир берүүчү зат - миристалконий хлориди, самын менен бузулат, ошондуктан жыныс органдарын жуу үчүн самынды минималдуу өлчөмдө дагы колдонууга тыюу салынат.

Өзгөчө көрсөтмөлөрү

Фарматекс туура колдонуу шартында кош бойлуудуктан сактанууда натыйжалуу дары болуп эсептелет. Бирок, спермициддик жергиликтүү контрацепция ыкмасы гормоналдык контрацепцияга, жатын ичине контрацептиваларга, диафрагмага, цервикалдык капкакчага же презервативке салыштырмалуу дайыма натыйжасы төмөнүрөөк. Контрацепциянын натыйжалуулугу анын колдонуу эрежелерин катуу сактоо менен байланыштуу.

- Ар бир жыныстык катнаштын алдында систематикалык колдонуу
- Жуунуу үчүн жыныстык катнашка чейинки 2 саатта жана жыныстык катнаштан кийинки 2 саат ичинде самын колдонууга болбойт, анткени анын калып калган калдыгы да Фарматекс дарысынын таасир берүүчү затын бузат.
- Жыныстык катнаштан кийин жыныс органынын сыртынан таза суу менен гана жууга болот. Кынды жуу (чайкоо) алдында жыныстык катнаштан кийин 2 саат аралыгын күтүү зарыл.
- Кынга куюлган Фарматекс дарысы менен, анын контрацептивдик таасирин төмөндөтүү коркунучун четтетүү үчүн ваннага жууну жана деңизге, бассейнге жана суусактагычтарда түшүүгө болбойт.
- Кын ооруларын дарылоо жана/же кандайдыр бир кынга башка дары каражатын дайындоо зарылчылыгы пайда болгон учурда Фарматекстин жардамы менен контрацепцияны жаңылантуу (баштоо) алдында дарыланып бүткөнгө чейин күтүү керек.
- Контрацепциянын бул ыкмасы жыныс жолу менен өткөн же адамдын имундук жетишсиздигинен козголгон вирустук инфекциядан коргобойт. Бул оорулардан бир гана коргоочу контрацепция ыкмасы бар – презерватив.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили

Кош бойлуулук мезгилинде дарыны колдонуу менен байланышкан кандайдыр бир зыяндуу таасир байкалган эмес: акыркы продуктунун тератогендик касиеттеринин экспертизасы таасир берүүчү заттын өзүнүн тератогендик касиеттеринин экспертизасы сыяктуу эле терс жыйынтыктарды берди. Эне сүтүнө ааз өлчөмдө кандайдыр бир белгилүү жагымсыз жыйынтыксыз өтүшү мүмкүн. Дары бала эмизүү мезгилинде колдонулушу мүмкүн.

Унаа каражаттарын же потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнүнө тийгизген таасиринин өзгөчүлүктөрү. Таасир бербейт.

Ашыкча доза

Аныкталган эмес.

Чыгаруу формасы жана тангакчасы

12 таблеткадан силикагель менен полиэтиленден капкак менен жабылган полипропилен тубдарга салышат. 1 ден туб медицинада колдонуу боюнча мамлекеттик жана орус тилдертндеги нускама менен бирге картон кутучага салышат.

Сактоо шарты

25°С дан жогору эмес аба табында сактоо зарыл.

Балдар жетбеген жерде сактоо керек!

Сактоо мөөнөтү

3 жыл

Тангакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Дарыканалардан берүү шарты

Рецепти жок.

Өндүрүүчү

Иннотера Шузи Рю Рене Шантеро Шузи-сюр-Сис, 41150 Валуар-сюр-Сис, Франция

Тангактоочу- уюштуруучу

Иннотек Интернациональ лабораториясы, Франция

Сапатын көзөмөлдөп чыгаруучу

Иннотера Шузи, Рю Рене Шантеро, Шузи–Сюр-Сис, 41150 Валуар- сюр-Сис, Франция

Кыргыз Республикасынын аймагында арыз-доолорду кабыл алуучу уюм:
«Промо-сервис» ЖЧК 720 044, Бишкек ш., Ч. Айтматов пр. 61/24 үй.
тел.: +996 (555) 97-90-39
e-mail: Dilvara.SHAKIROVA.consultant@innothera.com
www.innotech.ru

ФАРМАТЕКС

ДОРИ ВОСИТАСИНИ ТИБИЁТДА КҮЛЛАШ БҮЙИЧА ҮЙРІКНОМА

Савдо номи:
Фарматекс

Халкаро патенланмаган номи (ХПН):
Миристалконий хлориди

Дори шакли:
Қин таблеткалары.

Таркиби:
Фаол модда - миристалконий хлориди 20,0 мг
Ёрдамчи моддалар: натрий гидрокарбонати, сувсиз лимон кислотаси, коллоид кремний диоксиди, магний стеарати, микрокристаллик целлюлоза, лактоза моногидраты, макрогол 6000

Фармакотерапевтик гурухи:
Гинекологик касалликларни даволашда бошқа дори воситалари. Маҳаллий кўллаш учун контрацептивлар. Интравагинал контрацептивлар..
АТХ коди: G02BB.

Фармакологик хусусиятлары
Фармакокинетикаси

Миристалконий хлориди кин шиллик каватидан сўрилмайди, нормал

физиологик ажралмалар билан чикарилади ёки сув билан оддий ювиш оркали йўкотилади.

Фармакодинамикаси

Миристалконий хлориди бир вақтнинг ўзида спермицид ва антисептик восита хисобланади. Фаол модда сперматозоидларнинг мембранасини парчалайди. Сперматозидларнинг парчаланиши икки боскичда кечади: дастлаб думини, сўнгра бошчасини, бу шикастланган сперматозоид томонидан тухум хужайрани уруғланиш имконини йўқ бўлишига олиб келади.

Усулнинг самарадорлиги кўлланиш бўйича тавсияларни тўлиқ ва аниқ риоя этилишига боғлиқ.

Киннинг сапрофит флораси контрацептивлар таъсирида ўзгармайди – Фарматекс лактобациллар (Додерляйн таёкчасига) миқдорига таъсир қилмайди.

Фарматекс гормонал препарати эмас ва хайз даври, либидо ва аёллар фертил даврига таъсир кўрсатмайди.

Миристалконий хлориди антисептик таъсирига ҳам эга:

- In vitro* шаронтида, препарат жинсий йўли билан ўтадиган касалликларга нисбатан фаол, айниқса: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 2 тии, Staphylococcus aureus. Mycoplasma spp. га таъсир қилмайди ва Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi ва Treponema pallidum га суст таъсир қилады.
- In vivo* шаронтида, баъзи элементлар жинсий йўли билан ўтадиган касалликларга нисбатан фаол. Профилактик сифатида фойдаланиш тўғрисида маълумотлар йўқ.

Кўлланилиши

Репродуктив ёшдаги аёллар учун маҳаллий контрацепция, айниқса: - перорал контрацептивлар ва бачадон ички контрацепциясини кўллаш мумкин бўлмаганда;

- туғруқдан кейинги даврда, лактация даврида, ҳомиладорликни тўхтатишда, - менопаузадан олдинги даврда; - мунтазам бўлмаган жинсий алоқаларда;

- кин диафрагмаси ёки бачадон ички спирали кўлланганида кўшимча маҳаллий контрацепция сифатида кўлланилади, айниқса узок вақт ностероид ялиғланишга қарши препаратлар кўлланилганда

- доимий кўлланиладиган перорал контрацептивларни қабул қилишни ўтказиб юбориш ёки кечикишда. Бу ҳолатда хайз давригача бўлган кун давомида икки турдаги контрацепцияни кўллаш тавсия этилади.

Кўллаш усули ва дозалари

Қинга кўллаш учун.

Тўлиқ эриши учун сув билан хўлланган таблетка ётган ҳолатда қинга чуқур қилиб, жинсий алоқадан 10 минут олдин юборилади. Таъсир давомийлиги – 3 соатни ташкил этади. Ҳар бир қайта жинсий алоқадан олдин албатта янги таблеткани юбориш керак.

Бир марталик дозаси: бир таблетка битта жинсий алоқага мўлжалланган. Фарматекс кин диафрагмаси ёки бачадон ички спирали билан бирга кўлланилиши мумкин. Жинсий алоқадан сўнг фақат ташқи жинсий аъзоларни оддий сув билан ювиш мумкин.

Ножўя таъсирлари

- Аллергик реакциялар, контакт дерматит, кинда ва/ёки шерикнинг жинсий аъзосида қичишиш ва ачишиш, оғриқли сийиш. Улар пайдо бўлган ҳолларда Фарматекс препаратини кўлашни тўхтатиш керак.

Кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик

- кольпит, вагинит

- кин ва бачадон бўйни шиллик каватини яраланиши ва таъсирланишида - рухий касалликлар билан оғринган одамларда ёки контрацептив воситалардан фойдаланишга тўсқинлик қиладиган жинсий аъзоларда аралашувларга йўл қўймаган шахсларда

Дориларнинг ўзаро таъсири

Қинга юборилган ҳар қандай дори воситаси препаратнинг спермацид таъсирини фалсизлантиради. Фаол модда – миристалконий хлориди совун таъсирида парчаланади, шунинг учун хаттоки кам миқдорда бўлса ҳам жинсий аъзоларни тозалаш учун совундан фойдаланиш таъқилланади.

Махсус кўрсатмалар

Фарматекс ҳомиладорликдан сакланиш учун самарали препаратдир, агар препарат тўғри қўлланилса. Бирок, спермицид маҳаллий контрацепцияси доим гормонал контрацепцияси, бачадон ички контрацепцияси, кин диафрагмаси, цервикал копқоғи ёки презервативларга нисбатан доим самарасиз.

Контрацепциянинг самарадорлиги препаратни тўғри қўллашга боғлиқ.

- Ҳар бир жинсий алоқадан олдин мунтазам равишда кўлланилади.
- Жинсий алоқадан 2 соат олдин ва жинсий алоқадан кейин 2 соат давомида жинсий аъзоларни тозалаш учун совун ишлатиш таъқилланади, чунки совун Фарматекснинг таъсир этувчи моддасини парчалайди.
- Жинсий алоқадан кейин дарҳол ташқи жинсий аъзоларни фақат тоза сув билан тозалаш мумкин. Қянни ювиш жинсий алоқадан кейин 2 соат ўтган бажарилади.
- Қинга киритилган Фарматекс билан ванна қабул қилиш, денгизда, бассейнда ва сув хавзаларида чўмилиш, кейинги контрацептив таъсирини пасайиши хавфи туфайли мумкин эмас.
- Агар киннинг касаллигини даволаш ёки бошқа кин дори воситасини бюориш зарурлиги пайдо бўлганида, Фарматексни кўлланилишидан олдин даволанилишни тўхташини кутиш керак.
- Бу контрацепция усули жинсий алоқа йўли билан ўтадиган ёки Одам иммун танқислиги вируси сабаб бўлган инфекциялардан химоя қилмайди. Ушбу касаллликлардан фақат тўсиқли контрацептив усули –презерватив мавжуд.

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида кўлланилиши

Ҳомиладорлик вақтида препаратни кўллаш билан боғлиқ ҳеч қандай салбий таъсирлар аниқланмаган: сўнги модда ва фаол модда экспертиза натижалари тератоген таъсир кўрсатмади.

Онанинг сутига кириб бориши жуда кам миқдорда маълум салбий таъсирлар кўрсатмасдан амалга оширилиши мумкин. Препаратни эмизиш даврида кўллаш мумкин.

Транспорт воситаларини бошқариш қобилиятига таъсири
Таъсири йўқ.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилиши белгилари таърифланманган.

Чиқарилиш шакли

12 таблеткадан силикагелли полиэтилен тиқин билан беркитилган полипропилен тубада.

1 туба кўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шаронти

25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Қайд этиш гувоҳномаси берилган юридик шахс:

Лаборатория Иннотек Интернасональ
22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция
Ишлаб чиқарувчи:
Иннотера Шузи Рю Рене Шантеро Шузи-сюр-Сис 41150, Валуар-сюр-Сис, Франция