



ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА ПОЛИЖИНАКС® ВИРГО POLYGINAX® VIRGO

Препаратнинг савдо номи: Полижинакс® Вирго
МНН: йўқ

Дори шакли: қин ичига юбориш учун эмулсия капсулаларда.

Таркиби:

1 капсула сақлайди:

Фаол моддалар:

Неомицин сульфати35 000 ХБ

Полимиксин В сульфати35 000 ХБ

Нистатин100 000 ХБ

Ёрдамчи моддалар: гидрогенланган соя мойи, диметикон 1000, тефоз 63®: пальмитин кислотаси эфирлари ва стеарин кислотаси эфирлари.

Капсула қобиғининг таркиби: желатин, глицерол, диметикон 1000, тозаланган сув.

Таърифи: Оч-сарикдан оч жигарранг ранглигача бўлган, овал шаклли ўткир учли юмшоқ капсулалар. Капсула таркиби: оч-сарикдан оч жигарранг ранглигача бўлган мойли эмулсия.

Фармакотерапевтик гуруҳи: антибиотиклар (аминогликозид+циклик полипептид+ полиен).

АТХ коди: G01AX

Фармакологик хусусиятлари

Граммусбат (*Staphylococcus aureus*, коринебактериялар ва бошқалар) ва грамманфий микроорганизмларга (*Enterococcus faecium*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Nemophilus influenzae*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Ureaplasma urealyticum*) бактерицид таъсир кўрсатади.

Патоген замбуруғларга, айниқса ачитқисмон - *Candida albicans*, *Stryptococcus*, *Hystoplasma* тури замбуруғларига фунгицид таъсирга эга. Қин шиллик қаватининг трофик жараёнларини яхшилайдди.

Фармакокинетикаси

Қин шиллик қаватига текис тақсимланиб, маҳаллий бактерицид ва фунгицид таъсир кўрсатади. Қин шиллик қавати юзасидан деярли сўрилмайди.

Қўлланилиши

Даволаш учун.

- носпецифик, замбуруғли, аралаш вагинитлар, вульвовгинитлар ва цервиковагинитларда.

Олдини олиш учун.

- жинсий аъзолар соҳасидаги жарроҳлик аралашуви олтидан;

- бачадон ички диагностика муолажаси олтидан.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг ҳар қандай компонентига аллергия реакция.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланиши

Ҳомиладорлик вақтида шифокор маслаҳатисиз қўллаш тавсия этилмайди. Агар даволаниш вақтида Сиз ҳомиладор эканлигингизни сезсангиз, шифокорга мурожаат қилинг, чунки фақат у даволашни давом

этириш кераклиги ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Эмизши даврида препаратни қўллашдан сақланиш керак

Қўллаш усули ва дозалари

Қин ичига юбориш учун буюрилади. Бир капсуладан кечки ҳожатдан кейин, уйқу олтидан буюрилади. Капсуланинг ўткир учи кесилади ва уни секин сиқиб капсуланинг ичидагисини қинга юборилади. Дори препарати қинга юборилганидан кейин, капсулани чиқиндиларга қўшиб ташлаб юборилади. Даволаш курси 6 кунни ташкил қилади. Олдини олиш мақсадида препарат 6 кун давомида қўлланилади. Препаратни қабул қилиш ўтказиб юборилганида, даволашни одатдаги дозада қайтадан бошлаш керак.

Ножўя таъсирлари

Препаратнинг компонентларига аллергия реакция. Узок вақт қўлланилганида, буйрак етишмовчилигида аминокликозидларнинг тизимли ножўя таъсирларни намоён бўлиши кучайиб боради.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Спермицидлар билан бирга қўллаш тавсия этилмайди, чунки препаратнинг фаоллиги пасайиши мумкин.

Махсус кўрсатмалар

Препарат қиз болалар ва ўсмир қизларда қўллаш учун махсус ишлаб чиқарилган. Реинфекция хавфи ва касалликларнинг айрим кўзгатувчиларини унга чидамлилигини шаклланишини олдини олиш мақсадида, препаратни қўллаш муддати чегараланган бўлиши керак. Буйрак етишмовчилиги ҳолларида маслаҳат олиш учун шифокорга мурожаат қилинг. Даволаш вақтида қин ичига тампонларни қўллашдан сақланиш керак. Ҳайз кўриш вақтида даволашни тўхтатмаслик керак.

Дозани ошириб юборилиши

Тавсия этилган дозаларда қўлланганда, дозани ошириб юборилишининг эҳтимоли кам.

Чиқарилиш шакли

Қин ичига юбориш учун эмулсия, капсулаларда. 3 капсула ПВХ/ПВДХ/алюмин блистерда. 1 ёки 2 блистер қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шароити

15°C дан 25°C гача бўлган ҳароратда, болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

2 йил. Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи

“Laboratoire Innotech International, manufactured by Innothera Chouzy”, France
 (“Лаборатория Иннотек Интернациональ”, “Иннотера Шузи” да ишлаб чиқарилган, Франция),
 Rue Rene Chantreau, Chouzy-sur-Cisse, Valloire-sur-Cisse, 41150, France (Пю Рено Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция)



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПОЛИЖИНАКС® ВИРГО

Регистрационный номер: ЛСР-000023/09

от 11.01.2009

Торговое название: Полижинакс® Вирго

МНН: нет

Лекарственная форма: эмульсия для интравагинального введения в капсулах

Состав: 1 капсула содержит:

Активные вещества:

Неомицина сульфат 35 000 МЕ

Полимиксина В сульфат 35 000 МЕ

Нистатин 100 000 МЕ

Вспомогательные вещества: соевое масло гидрогенизированное, диметикон 1000, Тефоз 63®: эфиры пальмитиновой кислоты и эфиры стеариновой кислоты.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол, диметикон 1000, вода очищенная.

Описание

Мягкие капсулы от светло-желтого до светло-коричневого цвета, овальной формы с заостренным вытянутым концом. Содержимое капсул: масляная эмульсия от светло-желтого до коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

Антибиотик комбинированный.

(антибиотики: аминогликозид+полиен+циклический полипептид)

Код АТХ: G01AX

Фармакологические свойства

Оказывает бактерицидное действие на грамположительные (*Staphylococcus aureus*, коринебактерии и др.) и грамотрицательные микроорганизмы (*Enterococcus faecium*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Nemophilus influenzae*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Ureaplasma urealyticum*). Обладает фунгицидным действием на патогенные грибы, особенно дрожжеподобные рода *Candida albicans*, *Cryptococcus*, *Hustoplasma*. Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

Фармакокинетика. Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

Показания к применению

Лечение.

- неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты;

Профилактика.

- перед хирургическим вмешательством в области половых органов;

- перед внутриматочными диагностическими процедурами;

Противопоказания

Аллергическая реакция на любой компонент препарата.

Применение во время беременности и период грудного вскармливания

Во время беременности не рекомендуется применять без консультации врача. Если во время лечения Вы обнаружите, что беременны, обратитесь к врачу, т.к. только он сможет принять решение о необходимости продолжить лечение. Во время кормления грудью применения препарата необходимо избегать.

Способ применения и дозы

Для интравагинального введения. По одной капсуле после вечернего туалета, перед сном. Надрезав заостренный конец, и, слегка нажимая на капсулу, вводят содержимое капсулы во влагалище. После введения лекарственного препарата во влагалище, капсулу выбрасывают в мусор. Курс лечения 6 дней. С целью профилактики препарат применяют в течение 6 дней.

В случае пропуска приема препарата возобновить лечение необходимо в обычной дозе.

Побочное действие

Аллергические реакции на компоненты препарата. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов, усиливающееся в случаях почечной недостаточности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Особые указания

Препарат разработан специально для применения у девочек и девушек-подростков. Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции. В случае почечной недостаточности обратитесь за консультацией к врачу. Во время лечения необходимо воздерживаться от применения внутривлагалищных тампонов. Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Форма выпуска

Эмульсия для интравагинального введения в капсулах. 3 капсулы в ПВХ/ПВДХ/ алюминевом блистере. 1 или 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Производитель: «Laboratoire Innotech International, manufactured by Innothera Chouzy», France («Лаборатория Иннотек Интернациональ, произведено Иннотера Шузи», Франция), Rue Rene Chantereau, Chouzy-sur-Cisse, Valloire-sur-Cisse, 41150, France (Пю Рено Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция)